







Weißstorch Bestandsdaten Rheinland-Pfalz und Saarland






Populationsbiologische Daten – Mittelwerte 2000 – 2008

Anteil erfolgreicher Paare (%HPo): 18,2%
 Gesamtbrüterfolg (JZa): 2,28 Juv/HPa
 Teilbrüterfolg (JZm): 2,81 Juv/HPm



Populationsbiologische Daten – Mittelwerte 2000 – 2008

Anteil erfolgreicher Paare (%HPo): 34,4%
 Gesamtbrüterfolg (JZa): 2,66 Juv/HPa
 Teilbrüterfolg (JZm): 1,69 Juv/HPm



Erläuterungen:

Im Jahr 1973 starb der Weißstorch in der Pfalz aus. Seit 1997 wird ein Wiederansiedlungsprogramm durch die Aktion Pfalzstorch durchgeführt. Neben vielen praktischen Verbesserungen in den Lebensräumen des Weißstorchs wurden in Gefangenschaft gezüchtete Weißstörche in der Pfalz ausgesetzt. Die Rheinniederung wurde von Hessen und Baden-Württemberg aus natürlich wiederbesiedelt.



Kontakt:

Ingrid Dorner, NABU LAG Weißstorchschutz, Kaiserslautener Str. 150, 67098 Bad Dürkheim,

I.F.Dorner@t-online.de

Aktion „Pfalzstorch“, Storchenzentrum Bornheim, Kirchstr. 1, 76879 Bornheim, e-Mail

info@pfalzstorch.de



Rheinland-Pfalz – Bestandsentwicklung und Brutbiologische Daten 1904 – 2008

Jahr	HPa	HPm	HPo	% HPo	JZG	JZa	JZm	StD
1904	180	0	0		0	0,00	0,00	0,91
1933	50	0	0		0	0,00	0,00	0,25
1934	51	0	0		122	2,39	0,00	0,26
1948	71	66	5	7,0	186	2,62	2,82	0,36
1949	67	48	19	28,4	141	2,10	2,94	0,34
1950	55	44	11	20,0	121	2,20	2,75	0,28
1951	58	55	3	5,2	172	2,97	3,13	0,29
1952	57	0	0	0,0	0	0,00	0,00	0,29
1953	50	0	0	0,0	0	0,00	0,00	0,25
1954	45	31	14	31,1	91	2,02	2,94	0,23
1955	53	44	9	17,0	125	2,36	2,84	0,27
1956	51	44	7	13,7	121	2,37	2,75	0,26
1957	47	45	2	4,3	145	3,09	3,22	0,24
1958	46	40	6	13,0	109	2,37	2,73	0,23
1959	45	42	3	6,7	128	2,84	3,05	0,23
1960	46	35	11	23,9	94	2,04	2,69	0,23
1961	40	28	12	30,0	72	1,80	2,57	0,20
1962	23	17	6	26,1	42	1,83	2,47	0,12
1963	20	15	5	25,0	40	2,00	2,67	0,10
1964	17	12	5	29,4	41	2,41	3,42	0,09
1965	15	10	5	33,3	22	1,47	2,20	0,08
1966	15	13	2	13,3	40	2,67	3,08	0,08
1967	10	9	1	10,0	24	2,40	2,67	0,05
1968	8	8	0	0,0	18	2,25	2,25	0,04
1969	7	4	3	42,9	9	1,29	2,25	0,04
1970	3	3	0	0,0	8	2,67	2,67	0,02
1971	3	2	1	33,3	6	2,00	3,00	0,02
1972	2	1	1	50,0	3	1,50	3,00	0,01
1973	1	1	0	0,0	2	2,00	2,00	0,01

Jahr	HPa	HPm	HPo	% HPo	JZG	JZa	JZm	StD
1998	10	0	0	0,0	26	2,60	0,00	0,05
2000	24	24	0	0,0	55	2,29	2,29	0,12
2001	30	23	7	23,3	63	2,10	2,74	0,15
2002	35	20	15	42,9	60	1,71	3,00	0,16
2003	35	29	6	17,1	93	2,66	3,21	0,18
2005	35	29	6	17,1	83	2,37	2,86	0,18
2006	39	35	4	10,3	105	2,69	3,00	0,01
2007	49	40	9	18,4	107	2,18	2,68	0,25
2008	62	52	10	16,1	139	2,24	2,67	0,31

Saarland – Bestandsentwicklung und Brutbiologische Daten 1945 – 2008

Jahr	HPa	HPm	HPo	% HPo	JZG	JZa	JZm	StD
1945	1	0	0		0	0,00	0,00	0,04
1946	1	0	1	100,0	0	0,00	0,00	0,04
1947	1	0	0		0	0,00	0,00	0,04
1948	1	0	0		0	0,00	0,00	0,04
1949	1	0	0		0	0,00	0,00	0,04
1950	1	0	0		0	0,00	0,00	0,04
1951	1	0	0		0	0,00	0,00	0,04
1952	1	0	0		0	0,00	0,00	0,04
1953	1	0	0		0	0,00	0,00	0,04
1954	1	0	0		0	0,00	0,00	0,04
1955	1	0	0		0	0,00	0,00	0,04
1956	1	0	0		0	0,00	0,00	0,04
1957	1	0	0		0	0,00	0,00	0,04
1958	2	0	0		0	0,00	0,00	0,08
1959	3	0	0		0	0,00	0,00	0,12
1960	2	0	0		0	0,00	0,00	0,08
1961	2	0	0		0	0,00	0,00	0,08
1962	2	0	0		0	0,00	0,00	0,08
1963	2	0	0		0	0,00	0,00	0,08
1964	1	0	0		0	0,00	0,00	0,04
1965	1	0	0		0	0,00	0,00	0,04
1998	1	0	1	100,0	0	0,00	0,00	0,04
2000	1	1	0	0,0	5	5,00	5,00	0,04
2001	1	0	1	100,0	3	3,00	0,00	0,04
2002	1	0	1	100,0	2	2,00	0,00	0,04
2003	1	0	0	0,0	4	4,00	0,00	0,04
2004	1	1	0	0,0	3	3,00	3,00	0,04
2005	2	1	1	50,0	1	0,50	1,00	0,08
2006	2	2	0	0,0	3	1,50	1,50	0,08
2008	4	3	1	25,0	9	2,25	3,00	0,16